



# Avertissements<sup>®</sup> agricoles

Abonnement

annuel :

140,00 F

à l'ordre

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

STATION D'AVERTISSEMENTS

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES

Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



## spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N°11 DU 4 JUIN 1986

BLES : septoriose, 1er traitements "épis"

ESOURGEONS : helminthosporiose

ORGES DE PRINTEMPS : 1er traitement  
fongicide

BETTERAVES : pucerons noirs

POMMES DE TERRE : TRAITER MILDIOU

DIVERS : présentation d'essais

### BLES

SITUATION : le stade se situe au plein gonflement pour la majorité des parcelles, avec apparition des épis très localement.

Le piétin apparaît lentement, la fusariose est fréquente au pied, la montée de septoriose se confirme. L'oïdium encore très limité, risque d'évoluer par temps humide et doux.

PRECONISATIONS : dès que la septoriose atteint la 3ème feuille à partir du haut, de même pour l'oïdium, envisagez un traitement approprié (cf bulletin n°10).

### ESOURGEONS

SITUATION : l'helminthosporiose est fréquente sur F1 et F2, la rhynchosporiose a redémarré dans certaines parcelles et atteint la F3. L'oïdium apparaît.

PRECONISATIONS : les traitements "épis" sont faits, si non intervenez rapidement.

### ORGES DE PRINTEMPS

SITUATION : les parcelles se situent à plein tallage 1er noeud, l'oïdium est peu actif.

PRECONISATIONS : envisagez un traitement sur les plus précoces (risques d'évolution de l'helminthosporiose et de l'oïdium après les pluies)

7.43

## **BETTERAVES**

SITUATION : les premiers pucerons noirs sont observés dans le Cambrésis (en pièges et sur **betteraves**), dans l'Artois ; région de Montreuil. Les atomaires font des dégâts localement.

PRECONISATIONS : aucun traitement contre les pucerons ne se justifie dans l'immédiat, le temps frais et humide ayant ralenti les vols.

## **COLZA**

SITUATION : on observe quelques symptômes d'alternaria sur feuilles du bas

## **POMMES DE TERRE.**

SITUATION : le 3ème cycle de contaminations est en cours, un tas de déchets avec symptômes a été trouvé dans la région d'Albert. Les pluies sont favorables à l'évolution de l'épidémie jusque-là très modérée.

PRECONISATIONS : nous adresser tout échantillon porteur de mildiou. **TRAITEZ toutes les parcelles à 15-20 cm** avec une spécialité agissant par contact.

## **TOUTES CULTURES**

On observe sur de nombreuses cultures de grosses mouches noires ou rougeâtres. Il s'agit de bibions qui ne provoquent aucun dégât sur les cultures en place.

## **DIVERS**

Dans le cadre de l'opération **AGRIMIEUX 86** à Loos-en-Gohelle le mercredi 11 juin, le Service de la Protection des Végétaux présentera plusieurs essais : fongicides et herbicides céréales, insecticides betteraves, rhizoctone de la pomme de terre et divers symptômes ou dégâts (mosaïque, mouches grises).

Des matériels nouveaux de traitements contre le rhizoctone, seront par ailleurs présentés : micropulvérisation sur table de visite ; poudrage et pulvérisation sur planteuse ; ainsi qu'une bineuse chimique et un matériel de distribution granulés contre les limaces